DEEPCARE

HEIMTEST

GI MAP

Der GI MAP untersucht genetisches Material von Mikroorganismen und Marker der Darmgesundheit in einer Stuhlprobe. Sie nehmen die Probe zu Hause mit dem Material aus dem Kit und senden sie ans Labor. Ihr schriftlicher Bericht ist inbegriffen.

PREIS	DAUER	PROBE
CHF 399	21 Tage	Stuhl

WAS DAS KIT MISST

85 Marker


Der GI MAP untersucht genetisches Material von Mikroorganismen und Marker der Darmgesundheit in einer Stuhlprobe. Sie nehmen die Probe zu Hause mit dem Material aus dem Kit und senden sie ans Labor. Ihr schriftlicher Bericht ist inbegriffen.

Bakterielle Pathogene	Campylobacter · C. difficile, Toxin A · C. difficile, Toxin B · Enterohämorrhagische E. coli · E. coli O157
Parasitäre und virale Pathogene	Cryptosporidium · Entamoeba histolytica · Giardia · Adenovirus 40/41 · Norovirus GI/II
H. pylori und Virulenzfaktoren	Helicobacter pylori · Virulenzfaktor babA · Virulenzfaktor cagA · Virulenzfaktor dupA · Virulenzfaktor iceA
Phyla und Verhältnisse	Bacteroidetes · Firmicutes · Firmicutes/Bacteroidetes-Verhältnis
Kommensale und Keystone-Bakterien	Bacteroides fragilis · Bifidobacterium spp. · Enterococcus spp. · Escherichia spp. · Lactobacillus spp.
Opportunistische und Überwucherungs-Bakterien	Bacillus spp. · Enterococcus faecalis · Enterococcus faecium · Morganella spp. · Pseudomonas spp.

WIE DER BERICHT AUSSIEHT

Die Messwerte im Musterbericht.

Die Beispielwerte sind synthetisch und stammen von keiner realen Person.
Jede Zeile zeigt einen Messwert und den Vergleichsbereich des Labors.



In der Referenz | Nahe der Schwelle | Ausserhalb der Referenz

Parasitäre und virale Pathogene (Kopien/g)

Cryptosporidium (Cry)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Entamoeba histolytica (Eh)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Giardia (Gl)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Adenovirus 40 / 41 (Adv)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Norovirus GI / II (NoV)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	

H. pylori und Virulenzfaktoren (Kopien/g)

Helicobacter pylori (Hp)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Virulenzfaktor babA (babA)	N/A	Nicht nachgewiesen	
Virulenzfaktor cagA (cagA)	N/A	Nicht nachgewiesen	
Virulenzfaktor dupA (dupA)	N/A	Nicht nachgewiesen	
Virulenzfaktor iceA (iceA)	N/A	Nicht nachgewiesen	
Virulenzfaktor oipA (oipA)	N/A	Nicht nachgewiesen	
Virulenzfaktor vacA (vacA)	N/A	Nicht nachgewiesen	
Virulenzfaktor virB (virB)	N/A	Nicht nachgewiesen	
Virulenzfaktor virD (virD)	N/A	Nicht nachgewiesen	

In der Referenz · Nahe der Schwelle · Ausserhalb der Referenz

Phyla und Verhältnisse (Kopien/g)

Bacteroidetes (Bac)	1,20 × 10⁹	1,0 × 10⁹ – 5,0 × 10¹⁰	
Firmicutes (Firm)	9,50 × 10⁸	1,0 × 10⁹ – 5,0 × 10¹⁰	
Verhältnis Firmicutes : Bacteroidetes (F/B)	0,79	0,5 – 3,0	

Kommensale und Keystone-Bakterien (Kopien/g)

Bacteroides fragilis (Bf)	4,10 × 10⁸	1,0 × 10⁸ – 1,0 × 10¹⁰	
Bifidobacterium spp. (Bif)	8,50 × 10⁸	4,0 × 10⁸ – 4,0 × 10¹⁰	
Enterococcus spp. (Ent)	1,20 × 10⁷	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	
Escherichia spp. (Esc)	5,40 × 10⁷	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	
Lactobacillus spp. (Lact)	1,20 × 10⁵	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	
Enterobacter spp. (Etb)	1,20 × 10⁶	1,0 × 10⁵ – 1,0 × 10⁸	
Akkermansia muciniphila (Akk)	2,30 × 10⁷	1,0 × 10⁵ – 1,0 × 10⁹	
Faecalibacterium prausnitzii (Fp)	1,50 × 10⁸	1,0 × 10⁸ – 1,0 × 10¹⁰	
Roseburia spp. (Ros)	8,40 × 10⁶	1,0 × 10⁶ – 1,0 × 10⁹	

In der Referenz | Nahe der Schwelle | Ausserhalb der Referenz

Opportunistische und Überwucherungsbakterien (Kopien/g)

Bacillus spp. (Bac)	< 5,00 × 10⁴	< 5,00 × 10⁴	
Enterococcus faecalis (Ef)	2,10 × 10⁶	< 1,00 × 10⁷	
Enterococcus faecium (Efa)	< 1,00 × 10⁴	< 1,00 × 10⁴	
Morganella spp. (Mor)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Pseudomonas spp. (Ps)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Pseudomonas aeruginosa (Pa)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Staphylococcus spp. (Staph)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Staphylococcus aureus (Sau)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Streptococcus spp. (Str)	1,40 × 10⁵	< 1,00 × 10⁶	

Methanogene und Sulfatreduzierer (Kopien/g)

Desulfovibrio spp. (Dsv)	1,20 × 10⁵	< 5,00 × 10⁵	
Methanobacteriaceae (Mb)	4,20 × 10⁴	< 5,00 × 10⁴	

In der Referenz | Nahe der Schwelle | Ausserhalb der Referenz

Weitere Bakterien (Kopien/g)

Citrobacter spp. (Cit)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Citrobacter freundii (Cfr)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Klebsiella spp. (Kleb)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Klebsiella pneumoniae (Kp)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
M. avium subsp. paratuberculosis (MAP)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Proteus spp. (Pro)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Proteus mirabilis (Pm)	< 1,00 × 10³	< 1,00 × 10³	
Fusobacterium spp. (Fus)	< 5,00 × 10³	< 5,00 × 10³	
Prevotella spp. (Prev)	2,30 × 10⁶	< 1,00 × 10⁸	


In der Referenz | Nahe der Schwelle | Ausserhalb der Referenz

Pilze, Hefen und weitere Viren (Kopien/g)



Candida spp. (Csp)	1,40 × 10³	< 5,00 × 10³	
Candida albicans (Ca)	2,10 × 10³	< 5,00 × 10³	
Geotrichum spp. (Geo)	< 5,00 × 10²	< 5,00 × 10²	
Microsporidium spp. (Msp)	< 5,00 × 10²	< 5,00 × 10²	
Rhodotorula spp. (Rho)	< 5,00 × 10²	< 5,00 × 10²	
Cytomegalovirus (CMV)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Epstein-Barr-Virus (EBV)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	

In der Referenz | Nahe der Schwelle | Ausserhalb der Referenz

Protozoen (kommensal und potenziell pathogen) (Kopien/g)

Blastocystis hominis (Bh)	4,20 × 10³	< 2,00 × 10³	
Chilomastix mesnili (Cm)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Cyclospora spp. (Cyc)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Dientamoeba fragilis (Df)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Endolimax nana (En)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Entamoeba coli (Ec)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Pentatrichomonas hominis (Ph)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	

Würmer (Helminthen) (Kopien/g)

Ancylostoma duodenale (Ad)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Ascaris lumbricoides (Al)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Necator americanus (Nec)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Trichuris trichiura (Tri)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	
Taenia spp. (Tn)	< 1,00 × 10²	< 1,00 × 10²	

In der Referenz · Nahe der Schwelle · Ausserhalb der Referenz

Marker der Darmgesundheit

Steatocrit (Sct)	8 %	< 15 %	
Pankreas-Elastase 1 (PE-1)	480 µg/g	> 200 µg/g	
Beta-Glucuronidase (β-g)	1300 U/mL	< 2486 U/mL	
Okkultes Blut (FIT) (FIT)	< 10 µg/g	< 10 µg/g	
Sekretorisches IgA (sIgA)	280 µg/mL	510 – 2010 µg/mL	
Anti-Gliadin-IgA (AGA)	8 U/L	< 175 U/L	
Eosinophile Aktivierungsprotein (EDN)	1,10 µg/g	< 2,34 µg/g	
Calprotectin (Cal)	95 µg/g	< 173 µg/g	

DAS DIAGRAMM LESEN

Die Messwerte lesen.

Zu jedem Ergebnis gehören seine Einheit und sein Referenzbereich.

1. **Der Name.** Jede Zeile benennt das gemessene Element, den Organismus, das Hormon oder die Verbindung.
2. **Die Einheit.** Die Einheit beschreibt, wie das Labor den Messwert angibt.
3. **Der Messwert.** Diese Spalte enthält den Wert der eingesandten Probe.
4. **Der Referenzbereich.** Der Vergleichsbereich des Labors steht neben dem Ergebnis.
5. **Ihr schriftlicher Bericht.** Ihre Antworten und der Austausch per E-Mail bilden die Grundlage für Ihre persönliche Standortbestimmung.

IHR ENTHALTENER BERICHT

Ein persönlicher schriftlicher Bericht.

Jedes Deepcare-Kit enthält eine schriftliche Standortbestimmung auf Grundlage persönlicher Fragebögen, Ihrer Ergebnisse und des Austauschs per E-Mail.

- Nach der Zahlung erhalten Sie den ersten persönlichen Fragebogen per E-Mail.
- Bei Bedarf folgen Rückfragen per E-Mail oder mit einem weiteren Fragebogen.
- Der Bericht wird in Ihrer Sprache geschrieben: Deutsch, Französisch oder Englisch.
- Sie erhalten ihn innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ihren Antworten auf den letzten Fragebogen.

> *Ein schriftlicher Bericht, den Sie aufbewahren und Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt zeigen können.*

PROBENAHME ZU HAUSE

Ihre Stuhlprobe entnehmen.

Die Entnahme erfolgt an einem Tag, am Sonntag oder Montag. Frieren Sie den Gelpack vorher ein. Bewahren Sie die Probe bis zum Versand im Kühlschrank auf; die Probe darf nicht eingefroren werden. Beachten Sie die Anleitung Ihres Kits.

SCHRITT 01

Entnahme und Versand planen

Wählen Sie Sonntag oder Montag und organisieren Sie den Versand innerhalb von 24 Stunden. Füllen Sie das Formular aus und beschriften Sie das Röhrchen mit Name, Datum und Uhrzeit der Entnahme.

SCHRITT 02

Eine Stuhlprobe entnehmen

Verwenden Sie die mitgelieferte Auffangschale und das Röhrchen. Beachten Sie die Füllmarkierung und die Anleitung zum Mischen. Lassen Sie die Konservierungsflüssigkeit im Röhrchen.

SCHRITT 03

Die Probe im Kühlschrank lagern

Bewahren Sie die Probe im Beutel und gepolsterten Umschlag im Kühlschrank auf. Frieren Sie nur den Gelpack ein und lassen Sie ihn bis zum Verpacken im Gefrierfach.

SCHRITT 04

Innerhalb von 24 Stunden versenden

Versenden Sie möglichst am Entnahmetag. Eine Sonntagsprobe wird am Montag versandt. Legen Sie den vollständig gefrorenen Gelpack beim Verpacken dazu. Versenden Sie spätestens am Dienstag mit dem mitgelieferten Material.

ZUR METHODE

qPCR bei Diagnostic Solutions.

Diagnostic Solutions Laboratory · qPCR.

Die benannten Verbindungen werden in der eingesandten Probe gemessen. Die Ergebnisse stehen mit den Einheiten und Vergleichsbereichen des Labors im Bericht.

Die Kit-Seite auf deepcare.ch enthält die vollständige Markerliste und die wissenschaftlichen Quellen.

WIE ES WEITERGEHT

So bestellen Sie

HEUTE

Bestellung auf deepcare.ch

Bezahlen Sie mit Karte oder TWINT. Ihren ersten persönlichen Fragebogen erhalten Sie per E-Mail.

2 BIS 3 ARBEITSTAGE

Versand des Kits

Das Kit enthält ein Probenröhrchen, eine Auffangschale, einen Gelpack, die Anleitung und vorfrankiertes Rücksendematerial.

EIN ENTNAHMETAG

Probenahme und Rückversand

Entnehmen Sie die Probe am Sonntag oder Montag. Lagern Sie die Probe im Kühlschrank und frieren Sie den Gelpack ein. Versenden Sie innerhalb von 24 Stunden mit dem gefrorenen Gelpack gemäss Kit-Anleitung.

NACH DEN ANTWORTEN AUF DEN LETZTEN FRAGEBOGEN

Ihre schriftliche Standortbestimmung

Sie erhalten ihn innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ihren Antworten auf den letzten Fragebogen.

Dieses Kit bestellen

deepcare.ch/de/kits/gi-map